

## Cervikalna infiltracija korijena živca (periradikularna infiltracija)

kroatisch



**Veoma poštovana pacijentice, veoma poštovani pacijentu,**

Od strane Vašeg liječnika prijavljeni ste za infiltraciju korijena živca. Korijeni živaca poredani su obostrano simetrično i izlaze uvijek kroz male otvore između dva susjedna kralješka iz kanala leđne moždine. Kod Vas je jedan korijen živca ili više ovih korijena oštećeno međukralježničkim kolotom (hernia diska ili protruzija diska), artrozom malih zglobova kralježnice, uslijed generalnog sužavanja spinalnog kanala ili zbog sužavanja izlaznog otvora živca. Glavni cilj infiltracije je da se ciljanim ubrizgavanjem medikamenata ublaže Vaši bolovi. Time se može popustiti i eventualna zategnutost mišića i lakše ponovno postaju moguće mjere potpore, kao što je fizioterapija.


### Odvijanje infiltracije

Pregled se provodi pomoću računalne tomografije (CT). Ukupno ćete za planiranje i samu infiltraciju oko 15 minuta morati ležati na stomaku. Nakon kratkog razgovora radiolog na temelju određenih slika CT pregleda planira optimalni prilazni put. Kada je pronađeno odgovarajuće mjesto, koža se finom iglom čini neosjetljivom (lokalna anestezija). Igla se potom s malo poteza gura naprijed, pri čemu se višestruko lokalno anestezira, dok se vrh igle ne nađe kod lateralnog dijela fasetnog zgloba. Iz sigurnosnih razloga se cervicalno ne ubrizgava direktno kod korijena živca. U međuvremenu se pomoću nekoliko slika CT pregleda kontrolira položaj igle. Ukoliko se igla nalazi pored fasetnog zgloba, preko ove igle ubrizgava se malo kontrastnog sredstva, pri čemu se ono treba raširiti duž korijena živca. Preko iste igle se zatim ubrizgava malo kortizona i lokalni anestetik. Lokalna anestezija bi nakon nekoliko minuta trebala izazvati osjetno umanjenje bola. Kortizon sprječava lokalne upale. Kod cervicalne infiltracije korijena živca se iz sigurnosnih razloga koristi samo kortizon koji se rastvara u vodi. Po prestanku djelovanja lokalne anestezije (nekoliko časova) djelomično se ponovno može osjetiti Vaš poznati bol. Djelovanje kor-

tiona nastupa sve više nakon oko 1 - 3 dana. Rijetko ne nastupa umanjenje ranije postojećih bolova.

### Koje neželjene reakcije mogu nastupiti?

- Zbog lokalne anestezije u blizini živca možete nekoliko sati osjećati poremećaje osjeta (trnjenje) u ruci i možda slabost u ruci. Zbog toga također na nekoliko sati ne smijete voziti automobil.
- Rijetko se može formirati krvni podlijev.
- U odnosu na ubrizgavanje kontrastnog sredstva u venu alergije su znatno rijedče.
- Infekcije su veoma rijetke.
- Veoma su rijetke cirkulacijske smetnje (mozak, leđna moždina) uslijed ozljede stražnje vratne arterije.



**Podrazumijeva se da nam prije i tijekom infiltracije u svakom trenutku možete postavljati pitanja.**

Prezime:	<input type="text"/>
Ime:	<input type="text"/>
Datum rođenja:	<input type="text"/>

Molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja	da	ne
■ Da li uzimate sredstva za razređivanje krvi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Da li patite od infekcija?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Da li patite od šećerne bolesti (dijabetes)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Da li patite od alergija?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Da li ste trudni ili biste mogli biti trudni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Suglasan / suglasna sam s tim da se račun pošalje direktno osiguranju a da se u MRI u digitalnoj formi pohrani za mene.

Razumio / razumjela sam informacije, na sva pitanja odgovorio / odgovorila sam savjesno i suglasan / suglasna sam s provedbom infiltracije.

Datum:	Potpis pacijentice / pacijenta:	Radiolog:
--------	---------------------------------	-----------